CHLORÉTHYLE BENGUÉ

CHLORURE D'ÉTHYLE PUR ($C_2 H_5 Cl$)

POUR ANESTHÉSIE LOCALE

Admis dans les hôpitaux de France et de l'étranger le chlorure d'éthyle occupe aujourd'hui l'une des premières places parmi les anesthésiques locaux, pour son action rapide et sûre et pour son emploi pratique et inoffensif.

Son emploi se trouve justifié dans les interventions, très douloureuses ordinairement, et pouvant être rapidement pratiquées sur la peau ou certaines muqueuses facilement accessibles (abcès, furoncles, panaris,

Les dentistes utilisent aussi les propriétés anesthésiques du Chloréthyle pour l'extraction des dents, et les résultats obtenus sont excellents.

Enfin, le froid intense que donne l'évaporation de ce produit le fait également employer dans le traitement des névralgies diverses : faciales, sciatique, point de côté, lumbago, douleurs rhumatismales chroniques. Sous son action la douleur s'atténue rapidement.

INDICATIONS ET MODE D'EMPLOI

ANESTHÉSIE LOCALE

L'anesthésie locale dans le cas d'incision d'abcès, de furoncles, d'ablations de tumeurs sous-cutanées, et en général dans les interventions de « petite chirurgie » est facilement obtenue par le CHLORÉTHYLE BENGUÉ.

Pour obtenir cette anesthésie, il suffit de diriger le jet de CHLORÉTHYLE sur la partie à anesthésier, en tenant le flacon à une distance de 15 à 20 centimètres de la peau. Celle-ci devient rose, puis rouge intense, puis enfin blanche, parcheminée. La coloration blanche est un signe certain d'insensibilité, mais elle ne se produit pas toujours et malgré son absence, l'anesthésie peut cependant être complète. Généralement, l'insensibilité est produite en une demi à une minute, et dure environ deux minutes mais peut être prolongée suivant les besoins, si on prend soin d'augmenter la durée de pulvérisation.

ANALGÉSIE OU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

D'une façon générale, on peut dire que le CHLORÉTHYLE BENGUÉ donne de bons résultats dans le soulagement des douleurs

Gastralgie, névralgies frontales, faciales, dentaires, intercostales, lombaires (lumbago), sciatique, torticolis, douleurs rhumatismales, affections prurigineuses.

La réfrigération du CHLORÉTHYLE permet d'arrêter les saignements de nez en dirigeant le jet sur le front à la racine du nez, les vomissements incoercibles en dirigeant le jet sur le creux épigastrique.

Le froid intense que l'on peut obtenir avec ce liquide, 35° au dessous de zéro pourra être utilisé dans les insolations.

On se trouve encore bien de l'emploi du CHLORÉTHYLE dans les dyspnées nerveuses, asthme, et dans le hoquet : dans ce cas, pulvérisez à la base et sur les côtés de la poitrine.

Pour obtenir soulagement, on tient le flacon à une distance de 15 à 20 centimètres de la peau et on l'incline pour obtenir le jet qui est promené sur la partie douloureuse pendant une demi-minute ou une minute si cela est nécessaire. L'opération qui est absolument sans danger peut être répétée plusieurs fois au cours de la journée.

ART DENTAIRE

Dans l'extraction des dents, le jet peut être projeté à l'origine des nerfs dentaires, en avant de l'oreille pour les dents supérieures, et sur les bords de la mâchoire inférieure pour les dents du bas ; la pulvérisation doit être faite pendant une minute environ, mais l'anesthésie n'est pas aussi complète qu'en dirigeant le jet directement sur la gencive ; comme il n'y a aucun danger à procéder ainsi, nous conseillons l'anesthésie directe de la gencive, excepté pour les dernières molaires ou le jet ne peut être facilement dirigé et pour lesquelles les pulvérisations externes réussissent bien.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le CHLORÉTHYLE BENGUÉ est comprimé dans des flacons de verre de capacités différentes. Pour obtenir le jet de Chlorure d'Éthyle, il faut provoquer la pression à l'intérieur du flacon en inclinant ce dernier.

1° **Flacons verre :** en boîte individuelle	15 cm³ bouchage clapet,	P-classe 2
	30 cm³ bouchage clapet,	» 3
	50 cm³ bouchage clapet,	» 3
	100 cm³ bouchage clapet,	» 5
2° **Conditionnements hôpitaux**	Boîte de 4 flacons verre 15 cm³	P-classe 7
	Boîte de 3 flacons verre 30 cm³	» 7



Flacon verre 15, 30, 50, 100 cm³

REMARQUES

1° **LE CHLORÉTHYLE BENGUÉ est inflammable ; le tenir éloigné de toute flamme.**

2° L'emploi du CHLORÉTHYLE BENGUÉ est sans danger ; on peut l'appliquer aussi bien sur les muqueuses que sur la peau.

Si accidentellement cependant un peu de liquide pénètre dans l'œil, il peut causer une assez grande cuisson, mais ne produit aucune lésion ; il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout rentre dans l'ordre rapidement.

3° Le CHLORÉTHYLE BENGUÉ est très volatil. Reboucher soigneusement le flacon après chaque utilisation.

Dr. Benqué et fils

PHARMACIENS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 90.000 N. Frs

A. BENGUÉ, Pharmacien-Gérant

16, RUE BALLU - PARIS (IX°)

TÉL. : TRINITÉ 85-60

R. C. Seine 271.181 B

S.S. A.MQ A.T. C.P.
V. 28 10.373
V. 28.P. 39.334

IMP. ED. CHOGNARD - MONTREUIL